

Листовка: информация за пациента

**АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър 250 mg/100 mg/5 mg/10 ml сироп**  
 Парацетамол/ Гвайфенезин / Фенилефрин хидрохлорид

**ADIPAMOL® Antitussive Junior 250 mg/100 mg/5 mg/10 ml syrup**  
 Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine hydrochloride

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп
3. Как да използвате АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп и за какво се използва

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп е лекарство, съдържащо парацетамол, гвайфенезин и фенилефрин хидрохлорид и има аромат на малина.

Парацетамол овладява болката и понижава температурата. Гвайфенезин улеснява отхрачването, а фенилефрин хидрохлорид води до намаляване на секрецията от носа, отбъбване на лигавицата, облекчаване на затрудненото дишането.

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп се използва за краткосрочно лечение на главоболие, болки в гърлото, повишена температура, хрема, кихане, отпадналост, мускулни болки и продуктивна кашлица при простуда и грип. Това лекарство може да се прилага при деца на възраст над 6 години.

Ако след 3 дни Вашето дете не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.



## **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АДИПАМОЛ® Антитусив Джунийр сироп**

**Не използвайте за Вашето дете АДИПАМОЛ® Антитусив Джунийр сироп, ако:**

- то е алергично към парацетамол, гвайфенезин, фенилефрин хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б);
- страда от заболявания на черния дроб, бъбреците или сърцето или има високо кръвно налягане;
- има повишена функция на щитовидната жлеза или захарен диабет;
- има тумор, наречен феохромоцитом;
- страда от глаукома (повишено вътреочно налягане);
- уринира трудно;
- в момента се лекува или наскоро е приемало някои лекарства като MAO-инхибитори, трициклични антидепресанти, бета-блокери, симпатомиметици, включително прилагани като очни или носни капки, инхалатори;
- в момента приема други лекарства, съдържащи парацетамол.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате АДИПАМОЛ® Антитусив Джунийр сироп.

Необходимо е да знаете следното:

- Не прилагайте доза, по-висока от препоръчаната. Възможно е предозиране, необходимо е да се прилага възможно най-ниската доза, която има ефект;
- В случай, че прилагате и други лекарства, проверявайте дали те също не съдържат парацетамол, защото е възможно предозиране;
- При приемане на големи дози за продължителен период от време или при едновременно или редовно приемане на лекарства, увреждащи черния дроб, рискът от чернодробно увреждане се повишава;
- Ако Вашето дете има заболяване на сърцето, високи стойности на кръвното налягане, тежки заболявания на стомаха и червата, някои белодробни заболявания и особено астма, то трябва да приема това лекарство само след консултация с лекар;
- Прилагането на парацетамол може да повлияе резултатите при някои лабораторни тестове за определяне на пикочна киселина, а също и теста за определяне на глюкоза в кръвта. Уведомете лекаря, ако на Вашето дете предстоят някои лабораторни изследвания;
- Не трябва да прилагате това лекарство при деца под 6 години или с тегло под 20 kg, освен ако изрично не е назначено от лекар.

### **Консултирайте се с Вашия лекар, ако:**

- Проявите на болестта продължават по-дълго от 5 дни, а високата температура по-дълго от 3 дни. Той ще прецени дали се налага промяна в дозировката или е необходимо да се назначи друго лечение;
- Ако Вашето дете приема някое от следните лекарства или други неизброени в тази точка:
  - такива, съдържащи парацетамол



- предназначени за настинка, съдържащи деконгестант;
  - лекарства за разреждане на кръвта, например варфарин;
  - лекарства за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни болести, като бета-блокери или дигоксин;
  - средства за стимулиране или потискане на апетита;
  - лекарства за лечение на депресия;
- Има високо кръвно налягане, заболявания на сърцето, щитовидната жлеза или захарен диабет, повишено вътреочно налягане, болест на Рейно;
  - Детето е недохранено или с тегло под нормата, тъй като може да е необходима корекция на дозата;
  - Инфекцията е продължителна. В тези случаи има риск от възникване на метаболитна ацидоза, чиито прояви са дълбоко, учестено, затруднено дишане, позиви за повръщане, повръщане, загуба на апетит.

### **Други лекарства и АДПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало или е възможно да приеме други лекарства.

Не трябва да прилагате това лекарство едновременно с:

- други лекарства, съдържащи парацетамол и/или фенилефрин хидрохлорид или друг деконгестант;
- лекарства за лечение на депресия (трициклични антидепресанти, напр. амитриптилин) или инхибитори на моноаминооксизата. Възможно е да настъпи опасно повишение на кръвното налягане;

Необходимо е да знаете, че ако прилагате АДПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп едновременно с:

- лекарства за разреждане на кръвта, вкл. варфарин, е възможно кръвотечение, тъй като парацетамол усилва тяхното действие;
- таблетки за предпазване от забременяване, те могат да отслабят ефектите на парацетамол;
- лекарства, съдържащи метоклопрамид, домперидон или холестирамин е необходимо интервалът между отделните приеми да бъде поне 1 час;
- бета-блокери, дигоксин и други лекарства за лечение на сърдечни заболявания се повишава риска от нежелани реакции от страна на сърцето.
- обезболяващи и температуропонижаващи лекарства, вкл. аспирин се повишава рискът от увреждане на бъбреците;
- симпатомиметици (често срещани в капките за очи или нос) се повишава рискът от нежелани реакции от страна на сърцето.

### **АДПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп с храни, напитки и алкохол**

Няма ограничения.

Едновременно приложение с алкохол повишава риска от чернодробно увреждане, затова не трябва да се консумира алкохол по време на приема на това лекарство

### **Бременност, кърмене и фертилитет**



Този лекарствен продукт е предназначен за деца. Не трябва да се приема от бременни и кърмещи жени поради липса на данни за безопасното му приложение.

### **Шофиране и работа с машини**

Неприложимо. Това лекарство е предназначено за деца.

### **АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп съдържа сорбитол и пропиленгликол**

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие или Вашето дете имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с Вашия лекар преди Вие или Вашето дете да приемете това лекарство.

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп съдържа пропиленгликол, който може да причини симптоми на алкохолно опиянение.

### **3. Как да приемате АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп**

Винаги прилагайте АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Дозировка**

##### *Деца на възраст 6 - 12 години*

Препоръчителната доза е 10 ml (2 мерителни лъжички от 5 ml). При необходимост тя може да бъде приемана през интервал от 6 - 8 часа.

Не трябва да давате това лекарство през интервал по-малък от 6 часа, а дневната доза не бива да бъде по-голяма от 4 дози (40 ml).

##### *Деца на възраст над 12 години*

3-4 пъти дневно по 2 дози сироп (20 ml) през интервал от 6-8 часа.

Приемът на повече от 8 дози (80 ml) дневно не трябва да бъде превишаван, а интервалът между отделните приеми не трябва да бъде по-малък от 6 часа.

##### *Деца на възраст < 6 години*

Продуктът не е подходящ за приложение при деца < 6 години или с тегло под 20 kg, освен ако изрично не е назначен от лекар.

#### **Начин на приложение**

Това лекарство се прилага през устата.

Мерителната лъжичка се напълва със сироп до мярката. След всяка употреба лъжичката се измива и подсушава.

Обърнете внимание на следното:

- Това лекарство не трябва да се приема през интервал по-малък от 6 часа;
- Дневната доза не бива да бъде по-голяма от посочената по-горе;
- Винаги използвайте най-ниската доза, която оказва ефект;
- Това лекарство не трябва да се приема по-дълго от 3 дни, ако не е назначено от лекар;
- Задължително е да се обрнете към лекар в случай, че след 3 дневно лечение състоянието на Вашето дете не се подобри или оплакванията се появят отново.



**Ако сте приели повече от необходимата доза АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп**

Наблюдавани са отравяния с парацетамол при възрастни и особено при деца, които понякога могат да бъдат много сериозни. Те могат да се дължат на предозиране в резултат на приемане на по-висока от посочената доза или на инциденти по невнимание.

Предозирането се проявява с гадене, повръщане, бледност, коремни болки, изпотяване и сънливост, явяващи се най-често в първите 24 часа. При предозиране с парацетамол може да настъпи тежко чернодробно увреждане и загуба на съзнание. Приемането на високи дози фенилефрин може да доведе до значимо учестяване на сърдечната дейност и повишаване на кръвното налягане.

Ако сте приложили повече от препоръчителната доза или при поява на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар или посетете най-близкото медицинско заведение. Носете със себе си опаковката на лекарството.

**Ако сте пропуснали да приложите АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп**

Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това веднага щом се сетите. Не прилагайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако това се случи, уведомете Вашия лекар. При лечение с това лекарство е възможна появата на:

- Намаляване броя на кръвните плочки /тромбоцити/, което повишава риска от кървене и образуване на синини и на белите кръвни клетки /левкоцити/, което повишава риска от инфекции;
- Нарушения във функцията на черния дроб;
- Гадене, повръщане, диария, стомашно-чревно неразположение.
- Обриви, уртикария /т.нар. копривна треска/;
- Безсъние, нервност, безпокойство, възбуда, замаяност, главоболие;
- Разширяване на зениците, повишение на вътреочното налягане, влошаване на глаукома

Ако се появят някои от следните симптоми веднага прекратете приема на лекарството и се свържете с Вашия лекар:

- Тежка алергична реакция, която причинява оток в областта на очите, устните и гърлото, затруднено дишане или хриптене, тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи;
- Учестяване на сърдечната дейност, повишаване на кръвното налягане, което в някои случаи може да бъде значимо;
- Затруднения в уринирането и задръжка на урина;
- Жълтеница – пожълтяване на кожата и на бялата част на очите.



## Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ №8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### 5. Как да съхранявате АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца при температура под 25°C

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до “. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### Какво съдържа АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп

- Активните вещества в 10 ml сироп са: парацетамол 250 mg, гвайфенезин 100 mg и фенилефринов хидрохлорид 5 mg.
- Другите съставки са: сорбитол, глицерол, пропиленгликол, лимонена киселина, натриев цитрат, натриев цикламат, захарин натрий, натриев бензоат, аромат на малина, натурален (смес на натурални ароматни вещества и глюкоза), повидон К-30, пречистена вода.

#### Как изглежда АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп и какво съдържа опаковката

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп представлява бистър, безцветен, вискозен разтвор с аромат на малина.

АДИПАМОЛ® Антитусив Джуниър сироп се предлага в тъмни стъклени бутилки (тип III), съдържащи 150 ml сироп.  
Една бутилка в опаковка с мерителна лъжичка.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
«Адифарм» ЕАД  
Бул. «Симеоновско шосе» 130  
1700 София  
България

**Дата на последно преразглеждане на листовката – 04/2022**

