

# Ksivozan

Levocetirizine dihydrochloride

Неседативен антихистамин  
за симптоматично лечение  
на сезонен и целогодишен алергичен ринит  
и хронична уртикария



## Облекчава алергиите през цялата година при възрастни и деца над 2 години

- ★ Втора генерация H1 - антихистамини
- ★ Бързо начало на действие  
(по-малко от 1 час)
- ★ Продължителен антихистаминов отговор  
(ефектът продължава 24 часа)



Притежател на РУ:

**Адифарм ЕАД**

бул. "Симеоновско шосе" № 130, 1700 София, България, тел.: 02/8602000

КХП към РУ №II-35687/30.11.2016 и КХП към РУ №BG/MA/MP-46109/19.6.2019; ИАЛ: 20689/27.05.2020 г.

  
**adipharm**



## СЪСТАВ:

- Левоцетиризинов дихидрохлорид 5 mg в една таблетка
- Левоцетиризинов дихидрохлорид 5 mg в 1 ml перорални капки (равняващ се на 20 капки)

## ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ И ЕФЕКТИ:

- Алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит)
- Хронична идиопатична уртикария
- Високо ефективен** за облекчаване на симптомите: ринорея, кихане, сърбеж в носа и очите

## МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА КСИВОЗАН:

- Блокира рецепторите на хистамин
- 2 пъти по-висок афинитет към H1 рецепторите**, в сравнение с този на Цетиризин
- Не потиска отделянето на хистамин от мастните клетки, а възпрепятства свързването с рецепторите му
- Предотвратява отделянето на други алергични съединения и повишава притока на кръв към зоната, като облекчава типичните за Алергичния ринит симптоми
- Пиковите плазмени концентрации достигат 1 час след приемане на дозата

## ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчителна дневна доза	деца от 2 до 6 год.	> 6 год.	Възрастни
Ксивозан капки	2.5 mg, разделена на 2 приема 5 капки сутрин 5 капки вечер	5 mg = 20 капки	
Ксивозан филмирани таблетки		5 mg (1 филмирана таблетка)	5 mg (1 филмирана таблетка)

- Капките могат да се приемат директно или разредени с вода
- При алергичен ринит лечението е до изчезване на симптомите, при персистиращ алергичен ринит може да се назначи продължително лечение - съществува клиничен опит с приложение в продължение на 6 месеца
- При хронична уртикария и хроничен алергичен ринит съществува опит с приложение на цетиризин в продължение на 1 година
- Без необходимост от адаптиране на дозата при чернодробни увреждания, както и при пациенти в напреднала възраст (адаптиране на дозата само при пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане )
- Не повлиява способността за шофиране в препоръчваната доза

## КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Рандомизирано, двойно-сляпо кръстосано проучване с **Levocetirizine 5 mg** и плацебо капсули (Университета в Хелзинки), оценява ефикасността на **Levocetirizine 5 mg** върху пациенти чувствителни към ухапвания от комари (7):

- Резултат - Levocetirizine 5 mg** значително намалява размера на уртиките на 15-ата минута, като средният размер на уртиките е намален с 60%
- Levocetirizine 5 mg** намалява съпътстващия сърбеж на 15-ата минута с 62%
- Извод: Levocetirizine 5 mg** е ефективен и добре толериран медикament за лечение както на незабавните, така и на късните симптоми получаващи се след ухапване от комари.

## Източници:

Д-р Василка Кузева, сп. Мединфо, 10/2007, Левоцетиризин за профилактика и лечение на ранни и късни реакции към ухапвания от комари