

Листовка: Информация за пациента

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. №
Разрешение №
15-11-2022

Иновирекс® Форте
100 mg/ml сироп
инозин ацедобен димепранол

Inovirex® Forte
100 mg/ml syrup
inosine acedoben dimepranol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, от това, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Иновирекс® Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Иновирекс® Форте
3. Как да използвате Иновирекс® Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Иновирекс® Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Иновирекс® Форте и за какво се използва

Вашето лекарство, съдържа като активно вещество инозин ацедобен димепранол. Той има противовирусно действие и стимулира имунната система, като по този начин повишава способността на Вашия организъм да се справи с различни заболявания, причинени от вируси.

Това лекарство се прилага при лечението на грип и други вирусни инфекции засягащи дихателната система, при инфекции на половите органи причинени от херпес вирус, при херпес зостер и цитомегаловирус инфекции, морбили, заушка, варицела, хепатит, инфекциозна мононуклеоза, афтозен стоматит (възпаление и поява на болезнени язви по лигавицата на устната кухина), подостър склерозиращ паненцефалит (склерозиращо възпаление на мозъка, причинено от упорита инфекция с вируса на морбили).

Прилага се също така при генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома вирус.

Иновирекс се прилага при деца над 1 година, възрастни и при хора в старческа възраст.



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Иновирекс® Форте

Не приемайте Иновирекс® Форте, ако:

- сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- в момента имате обострена подагра;
- ако имате повишени нива на пикочната киселина.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Иновирекс® Форте.

Необходимо е да уведомите Вашия лекар, преди да започнете лечение с това лекарство, ако имате или сте имали:

- подагра или повишени нива на пикочна киселина в кръвта и/или урината;
- камъни в бъбреците и/или пикочния мехур;
- бъбречно заболяване.

Необходимо е да бъдете информирани, че ако за лечението на Вашето заболяване е необходимо продължително приложение на това лекарство, Вашият лекар ще назначи редовно проследяване на някои лабораторни показатели, както и редовна проверка на функцията на черния дроб и бъбреците.

Важно е да знаете, че ако получите или имате съмнение, че са налице признаци на алергична реакция (напр. обрив, сърбеж, затруднено дишане, подуване на лицето, устните, гърлото или езика) е необходимо да прекратите приема на това лекарство и да се свържете незабавно с лекаря си.

Други лекарства и Иновирекс® Форте

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно е да знаете, че това лекарство може да промени действието на някои едновременно прилагани с него лекарства. Затова е особено важно да информирате своя лекар, ако приемате:

- лекарства от групата на диуретиците (отводняващи средства), като фуросемид, етакринова киселина, хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид;
- алопуринол и други средства за лечение на подагра;
- лекарство, които потискат имунната система (напр. след присаждане на орган);
- зидовудин (азидотимидин, за лечение на СПИН).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.



Вашият лекар ще прецени дали е възможно да прилагате това лекарство, ако сте бременна или кърмите. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Иновирекс® Форте обикновено не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Иновирекс® Форте съдържа метил парахидроксибензоат и захароза

Това лекарство съдържа метил парахидроксибензоат, който може да причини алергични реакции (вероятно от забавен тип).

Една обичайна доза от 5 ml съдържа 2 g захароза, което трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Ако сте били информирани от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Иновирекс® Форте

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и лица над 65 години

Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 0,5 ml за 1 kg телесно тегло).

Не трябва да приемате дневна доза, по-голяма от 4 g (40 ml сироп).

Иновирекс® Форте сироп не трябва да се приема по-дълго от 7 дни без консултация с лекар.

Деца на възраст над 1 година

Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 0,5 ml за 1 kg телесно тегло). За улеснение на дозирането, следва да се използва таблицата по-долу:

Телесно тегло	Дозировка
10 – 14 kg	3 x 2,5 ml
15 – 20 kg	3 x 2,5 – 3,75 ml
21 – 30 kg	3 x 3,75 – 5 ml
31 – 40 kg	3 x 5 – 7,5 ml
41 – 50 kg	3 x 7,5 – 8,75 ml

Начин на приложение


Сиропът се приема през устата, като се използва наличната в опаковката мерителна лъжичка.

За улесняване на дозирането мерителната лъжичка е с деления 1,25 ml, 2,5 ml и 5 ml.

Определената дневна доза се прилага в няколко (обикновено 3 – 4) равномерни приема.

Ако сте приели повече от необходимата доза Иновирекс® Форте

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



Ако сте приели по-голяма доза от назначената Ви или чувствате неразположение посъветвайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете Иновирекс®Форте

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете дозата, веднага щом се сетите. Ако е време за следващата доза, продължете по обичайната схема.

Ако прекратите приема на Иновирекс®Форте

Кога трябва да прекратите приложението на това лекарство ще определи лекаря. Не прекъсвайте прилагането на лекарството, ако това не е назначено от лекар. Ако спрете лечението е възможно желаният ефект да не може да бъде постигнат или симптомите на Вашето заболяване да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Необходимо е незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако получите:

- Внезапно хриптене/свирене на гърдите;
- Затруднено дишане и/или замайване;
- Подуване на клепачите, лицето и гърлото;
- Обрив и сърбеж, разпространен по цялото тяло.

Посочените по-горе прояви могат да бъдат симптоми на сериозни алергични реакции, които макар и много рядко не могат да бъдат изключени при приема на това лекарство.

При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции:

Много чести (срещат се поне при 1 на всеки 10 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството):

- Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината;

Чести (срещат се поне при 1 на всеки 100 и при по-малко от 1 от всеки 10 лица, прилагали лекарството):

- Повръщане, гадене, неразположение в областта на стомаха;
- Повишени стойности на някои лабораторни показатели (кръвна урея, трансаминази и алкална фосфатаза);
- Обрив, сърбеж;
- Главоболие, световъртеж;
- Болки в ставите;
- Умора, неразположение.

Нечести (срещат се поне при 1 на всеки 1000 и при по-малко от 1 на всеки 100 лица, прилагали лекарството):

- Диария, запек;
- Сънливост, безсъние;



- Нервност;
- Повишено количество на отделената урина.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- Болка в горната коремна област;
- Зачервяване;
- Замаяност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8
1303 София
тел.: +35928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като, съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Иновирекс® Форте

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след съкращението „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първото отваряне на бутилката – 6 месеца при температура под 25°C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Иновирекс® Форте

- Активното вещество в 1 ml сироп е 100 mg инозин ацедобен димепранол
- Другите съставки (помощни вещества) са: захароза, глицерол, метил парахидроксibenзоат (E 218), натриев цитрат, захарин натрий, аромат на малина (смес на натурални ароматни вещества и глюкоза), пречистена вода.

Как изглежда Иновирекс® Форте и какво съдържа опаковката

120 ml бистра, почти безцветна течност с аромат на малина в тъмни стъклени бутилки.



Една бутилка в опаковка с мерителна лъжичка с деления 1,25 ml; 2,5 ml и 5 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Адифарм ЕАД
бул. "Симеоновско шосе" № 130
1700 София
България

Дата на последно преразглеждане на листовката

10/ 2022

