

IBULEK **400** mg powder for oral solution Ibuprofen / Ибупрофен

БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН ПРИ БОЛКА И ВЪЗПАЛЕНИЕ



- Главоболие
- Менструални болки
- Ревматични болки
- Зъбобол
- Повишена температура



ИАЛ № А 165 / 06.07.2017 год.

**Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката.**

ИБУЛЕК **400** mg прах за перорален разтвор

Ibuprofen / Ибупрофен

БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН ПРИ БОЛКА И ВЪЗПАЛЕНИЕ

Ибулек 400 прах за перорален разтвор е лекарствен продукт от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени средства, който се използва успешно за симптоматично лечение на: Лека до умерена болка с различен произход (главоболие, вкл. тензионно и мигренозно главоболие, болка в гърба, ревматични и мускулни болки, зъбобол, болка след стоматологични интервенции, вкл. зъбна екстракция, дисменорея), повишена температура и симптоми на простуда и грип. **Ибулек 400** се прилага при възрастни и деца над 12 години.

Ибулек 400 съдържа ибупрофен под формата на ибупрофен лизин. Ибупрофен лизин се абсорбира значително по-бързо в организма, преминава в кръвта и достига до източника на болката като много бързо и ефективно я облекчава.

Начин на приложение:

Съдържимото на едно саше се разтваря в чаша с достатъчно количество питейна вода със стайна температура и се разбърква добре до получаване на хомогенен разтвор, който се приема през устата независимо от времето за хранене. Приемът на храна може да забави леко резорбцията и настъпването на ефекта, но от друга страна подобрява стомашно-чревната поносимост. Преди употреба прочетете листовката.

Дозировка:

Възрастни и деца на възраст над 12 години (телесно тегло > 40 kg)
Начална доза - 400 mg (1 саше). При необходимост, по едно саше може да бъде прилагано до три пъти дневно. Интервалът между отделните приеми не трябва да бъде по-малък от 6 часа. Максималната дневна доза от 1200 mg (3 сашета), когато продуктът се прилага без лекарско предписание, не трябва да бъде надвишавана.